

SCALA 1 : 5.000



REGIONE ABRUZZO
PROVINCIA CHIETI

ORTONA- SAN VITO CHIETINO-ROCCA SAN GIOVANNI-FOSSACESIA-TORINO DI SANGRO-CASALBORDINO-VASTO

REGIONE ABRUZZO PAR FAS - FAS 2007-2013 Obiettivo Specifico IV.2 - Obiettivo Operativo IV.2.2 - Linea di Azione IV.2.2.a Bando di Gara a Procedura aperta Direttiva 2004/18/CE. Lavori per la realizzazione della via Verde della Costa dei Trabocchi del Comune di Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni,Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto.

CUP D91B1300049002 CIG 63262781C2

PROGETTO DEFINITIVO

COD.	DESCRIZIONE	SCALA	DATA
D6.I	CARTA GEOMORFOLOGICA	1 : 5.000	OTTOBRE 2015

PROGETTISTI INCARICATI:

Arch. BANDINI PAOLO (Mandatario)
Ing. FARINA LUIGI
Ing. PIETROMARTIRE LORENZO
Geol. CAVALLUCCI SILVIO
Ing. TUCCI ALESSANDRO-GEINA SRL
Arch. BOMBA CRISTIAN
Geom. D'AMBROSIO ORAZIO
Arch. ZAVARELLA ANTONIO
Ing. GALANO ALESSANDRO

IMPRESE CONCORRENTI:

CO.GE.PRI. SRL (Mandataria)
DI PERSIO COSTRUZIONI SRL
TENAGLIA SRL
STRADE E AMBIENTE SRL
EUROIMPIANTI SRL

Il responsabile del procedimento: Arch. Valerio A. Ursini

			STATO DI ATTIVITA'		
			ATTIVO	QUIESCENTE	NON ATTIVO
FORME, PROCESSI E DEPOSITI GRAVITATIVI DI VERSANTE		ORLO DI SCARPATA DI FRANA			
		VERSANTE INTERESSATO DA DEFORMAZIONI SUPERFICIALI LENTE			
		CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO TRASLATIVO			
		CORPO DI FRANA PER SCORRIMENTO ROTAZIONALE			
		CORPO DI FRANA PER COLAMENTO			
		FRANA DI PICCOLE DIMENSIONI			
FORME, PROCESSI E DEPOSITI FLUVIALI E DI VERSANTE PER ACQUE CONNOTATE SUPERFICIALI		ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE FLUVIALE O TORRENTIZIA			
		ALVEO IN EROSIONE LATERALE O SPONDA IN EROSIONE			
		ALVEO CON TENDENZA ALL'APPROFONDIMENTO			
		SOLCO DI RUSCELLAMENTO CONCENTRATO			
		CONOIDE ALLUVIONALE			
		ORLO DI TERRAZZO FLUVIALE			
		VALLE A FONDO PIATTO			
FORME E PROCESSI MARINO-COSTIERI		ORLO DI SCARPATA DI EROSIONE MARINA			
		LINEA DI ARENILE IN AVANZAMENTO			
		LINEA DI ARENILE IN ARRETRAMENTO			
		PICCOLA FRANA SULLA LINEA DI COSTA			
		LIMITE INFERIORE DI FRANA SOMMERSO			
DEPOSITI QUATERNARI	COLTRI DETRITICHE ELUVIO-COLLUVIALI	depositi costituiti da materiali a granulometria mista, limoso-ghiaiosi-sabbiosi, con frammenti litoidi angolosi, subordinati, selciferi e calcari, di colore da giallastro scuro a bruno, talora con chiazze e bande grafio-ocracee. Sono spesso presenti limiti, nodili e veli di concrezione calcarea.			
	COLTRI ELUVIO-COLLUVIALI GHIAMOSE	materiali a granulometria prevalentemente ghiaiosa in pesca matrice sabbioso-siltosa. le ghiaie sono poligeniche, da subangolose a ben arrotondate, eterometriche.			
	DEPOSITI ALLUVIONALI DI FONDOVALLE	sabbie e ghiaie con livelli e lenti di argilli e torbe; stratificazione per lo più lenticolare e/o caotica. Le ghiaie sono poligeniche, da subangolose a ben arrotondate, con diametro al decimetro, da subangolose ad arrotondate. Intercalazioni di sabbie eterometriche e limi sabbiosi; talora resti di paleosuoli bruno-rossastri. Ex voluma della fascia di costa i livelli sono immergiscati con arcosenti marini di alta energia.			
	DEPOSITI ALLUVIONALI TERRAZZATI	conglomerati poligenici, eterometrici, a strati da sottili a molto spessi disposti ad cuneo da pianura ad inclinazioni, alternati a sabbie grossolane in lenti e strati da medi a fini o, più raramente, a livelli secondari di argille siltose. Il grado di cementazione è molto variabile, sia nei conglomerati che nelle sabbie, in relazione alla loro età e alla loro sedimentazione. Strati quali triangoli a base da concavo a molto larga. La facies sedimentaria varia da quella deltizia e di spiaggia di alta energia verso nord a quella di piana alluvionale a bassa energia, con intercalazioni di paleosuoli, verso sud. Il tutto ensoso costituito da una serie di canali anastomizzati basal e molto larga. Presenza al tetto di lenti e nodi di paleosuolo rubefatti, decarbonati e talora argillificati.			
	DEPOSITI LITORANEI	sabbie scelte medio-fine, poligeniche, e ghiaie eterometriche con ciottoli generalmente discoidali, da arrotondate a subarrotondate			
	DEPOSITI ANTROPICI	materiali cretici ed eterometrici costituiti da tutte le frazioni granulometriche con inglobati frammenti eterometrici di manufatti e resti di utensili			
FORME ANTROPICHE	SCOGLIERE FARAGNIDE				
	ARGINI FLUVIALI				
	RILEVATO				